accouchement.

Observations,

sur un Dépôt contenu dans la capacité du bas ventre.

Le 29 Juin 1777. j'ai été mandé Rüe de la grande Trüanderie pour y voir la femme d'un huissier de la Chambre des comptes, que je trouvai en Douleurs d'Enfantement; Comme elle n'étoit qu'au terme de 7. Mois, je ne jugeai pas à propos de presser les Douleurs, au contraire je fis coucher la Malade et lui ordonnai une portion calmante : Trois jours se passèrent Tranquilement.

Le quatrième, Les Douleurs reprirent avec une force considérable, La Malade ne trouvoit aucune position Supportable ; je m'assurai, pour lors, de l'état de la Matrice Et je trouvai Son Orifice dilaté de la Largeur d'une piece de 12. Sols.

à L'Inspection du ventre de la Malade On l'auroit jugée grosse de plusieurs Enfans ; Mais dans un Cas aussi Epineux je poussai mes Recherches plus Loin, Et je reconnûs un fluide dans le ventre ; je jugeai que C'étoit une Hydropisie, Simplement Symptomatique, provenant de la Compression de l'Enfant, et qu'Enconsequence En enlevant la Cause, l'effet cesseroit bientôt

Quoiqu'il en fût, Les Douleurs Loin de diminuer, augmenterent de plus en plus et mirent La Malade qui etoit d'une foible Complexion au point que les forces lui manquérent

je relouchai la Malade pour la 2.e fois. je m'apperçûs

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE
A.RC 39, n°8

que l'Enfant etoit très bas Sans que l'Orifice fût plus dilaté : Cependant j'augurai Relativement aux Douleurs Excessives de la Malade, que l'accouchement ne tarderoit pas ; je fus trompé dans mon attente ; Les Douleurs se calmèrent et diminuèrent au point que la Malade n'avoit plus qu'un etat de Mal-aise qui n'opéroit Nulle Dilatation de plus à la Matrice

Dans une telle Complication de Maladie, je fis appeller Mr Thevenot, mon Confrere, pour m'aider de Ses Conseils ; Il toucha la Malade, Et reconnut le même etat de la Matrice Sans aucune dilatation plus marquée. Le Septieme jour, Les Douleurs reprirent encore avec plus de force que le quatrieme deja Cité : La Malade etoit menacée de Suffocation, par les Tiraillemens excessifs qu'elle eprouvoit dans Les Lombes.

Nous consultâmes Sur le party qu'il y avoit à prendre, Mr. Thevenot et Moi, Et Quoique l'hydropisie Contre indiquât la Saignée, Malgré notre Répugnance à Nous y déterminer, les Douleurs Excessives Nous forcèrent à en faire deux dans les 24. heures. Malgré cela L'Orifice n'etoit pas plus dilaté que auparavant ; Les Douleurs augmenterent toujours de plus en plus Et Nous craîgnimes que la Mere et l'Enfant périssent plutôt que Nous L'avions prédit.

Enfin il ne Nous restoit plus d'autre ressource que Le Bain, quelque Contraire qu'il nous parût Eu egard à l'Hydropisie ; La meme Raison des Douleurs insupportables Nous y força.

La Malade y resta 3/4. d'heure Et y eprouva

un Bien-être qui l'empêchoit de se résoudre à en sortir.
Malgré ce Soulagement momentané Nous sentions bien que ce Remède, continué longtems, augmenteroit Le fluide déja Trop abondant dans la Capacité du Bas Ventre et empecheroit la Contraction des fibres de la Matrice, En la faisant tomber dans une Espèce d'Inertie, Source inépuisable des accidens de cette maladie.

Nous fumes donc forcés, Le 8e jour, par les Douleurs continuelles, de chercher Les Moÿens de hâter l'accouchement; Nous rompimes les membranes; Le peu d'eau qu'elles contenoient, s'écoula:
La Nuit du 8. au 9. forcés de terminer l'accouchement par le Danger urgent de l'Enfant et de la Mere Nous trouvâmes heureusement l'Orifice de La Matrice, assez dilaté pour admettre le forceps, je Le fis et je tirai un Enfant qui à Vecu Vingt quatre heures.

Les 4. premiers jours se passerent tranquilement Les Lochies coulerent comme il Le falloit; Le 5e jour elles changerent de Couleur et blanchirent; mais le Ventre grossissoit à Vüe d'oeil, Le 6e. Les hoquets Et Vomissemens de matière bilieuse Et après cela Verte, s'emparèrent de la Malade; Et Son Epaisseur annonçoit Venir de la Vessicule du fiel, Le 8. la Couleur des Vomissemens devint plus foncée Et brouillée de Matiéres stercorales qui à la fin la malade rendit par jattes en abondance.
Certain alors que le Canal intestinal etoit

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

géné dans ses fonctions, j'imaginai quatre manieres différentes dont il pouvoit l'être, c'est à dire, par Pincement, par un Volvulus, en Colonne torse, ou enfin par la Cohésion des premiers parois. Je crois bien que les 3. premiers cas n'étoient pour rien alors, mais bien la Cohésion occasionnée par l'Inflammation qui preceda le Dépôt comme la suite le fera voir.

Le 9.e jour, le tems de la Couche fini, j'appellai M.r Lorry en Consultation, et nous décidâmes la Ponction que je fis sur le champ. Mais aulieu de l'eau que j'attendois, je ne tirai que du Pûs semblable à de la Lie de vin qui annoncoit des Bris de Vaisseau melés de filamens Blanchatres qui feroient croire a la fonte en partie de l'Epipelon.

De ce moment les vomissemens finirent, il n'en restoit que de Légers hoquets suivis de quelques eaux assez Limpides ; Nous fimes prendre à la malade des acides aigrelets tels que 4. onces de Tamarin fondû dans une pinte d'eau de vichies avec un grain d'Emétique : Cette Boisson procuroit des Evacuations suffisantes.

Ce même jour 9.e après la Ponction je fis appeller M.r Moreau avec nous, et l'on décida qu'il falloit différer la 2.e Ponction parcequ'on ne sentoit encore que trés obscurement la Colonne du fluide et qu'il n'étoit indiqué que par un Empatement trés profond.

Nous laissames donc ecouler 23. jours,

Et Le 3. Août ayant rassemblé MM Lorry, Moreau, Tenon et Bordenave, il fût décidé d'une Commune voix, qu'il falloit en venir a une 2e ponction Et que si le Liquide contenu ne pouvoit pas sortir par la Canulle ordinaire, je ferois le long de la Cannelure, une Incision de 2. pouces ou environ

Nous en fûmes exemptés; Le Pûs sortit par la Canulle, mais moins qu'à la 1ere ponction, Car La quantité n'alla qu'a 6. pintes Et par la suite Il en sortit 2. pintes par jour en deux pansemens, je me servis de la Canulle ordinaire Et je remedioit à son trop de longueur par une plaque de Liége plus ou moins epaisse: j'avois proposé la Canulle de Mr Dupuis, mais elle parût, ainsi qu'a moi, d'un trop petit diamètre. je corrigeai cet Inconvénient Et 3. jours après je substituai avec succès la mienne en présence de Mrs Lorry et Tenon; elle a resté jusqu'au jour de la Mort de la Malade, ou je la retirai Noire comme du fer, Et je fûs obligé de l'envoyer au Polisseur pour lui rendre sa Couleur naturelle.

Je faisois par le moyen de cette Canulle Des Injections d'Eau d'Orge à chaque pansement L'Injection sortoit à volonté en faisant une Compression proche de l'aîne gauche, a 3. doigts de la Ligne blanche et de l'os des Isles; Et en remontant vers la Canule, Le pûs sortoit par Le même Moyen; Ce qui me porteroit à croire

ACADEMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHEQUE

que le Dépôt etoit dans une espece de Kiste
Le pûs a continué de Sortir jusquau 15 août à la quantité de 2 pintes par jour ; apres il diminua de moitié, a raison dun Devoyment de Couleur Brunâtre qui a conduit la Malade au Tombeau Le 22. août . La Totalité de l'Ecoulement du pûs peut être evaluée a 27. pintes ; La Maladie dura 60. jours

Tous les gens de l'art Savent que dans le Cas dun fluide contenu en dedans un Kiste ou dans la Capaicité du Bas ventre, il peut arriver un tel derangement que les parties contenües du ventre soiem rapprochées de ses parois Et appliquées immédiatement aux parties Contenantes ; On conçoit quàlors une Canulle trop Longue, pouroit blesser quelque viscère Et que C'est au Génie du Chirurgien à corriger ce défaut Soit par une plaque de Liége, Soit par des Changemens faits à la Canulle, Comme je l'ai dit dans la Description du Troisquart que j'ai eû lhonneur de lire à l'academie

Quant aux Réflexions que je pourrois ajouter à cette Observation, je conviens que je n'en puis faire que de supposées, attendû qu'il m'a été absolument impossible d'obtenir de la famille l'ouverture du Corps.

Il paroît vraisemblable que C'étoit un Dépôt Enkiste placé comme je l'ai dit plus haut, puisquen appuïjant a cet Endroit, en Remontant de

bas enhaut, le fluide sortoit à volonté, et parconséquent Lendroit que l'on auroit pû soupçonner le Siége de la Maladie, ne l'etoit pas réellement. Ce n'étoit pas Nonplus du pûs epanché dans la Capacité du bas Ventre puisque dans cette Supposition une Simple ponction dans un Seul Endroit, n'auroit pas Suffi.

Mais Quelle a été la Cause de ce dépôt? C'est ce qu'il Seroit fort difficile de déterminer. je pourois Seulement donner comme Cause premiere et eloignée, Beaucoup de Chagrin que la Malade eprouva etant fille, un etat de Maigreur et de foiblesse Continuel qui annonçoit l'appaurissement du Sang et la dépravation des humeurs.

Quant à la Cause prochaine et immédiate je n'en pourois Soupçonner qu'une Seule, c'est que la Malade ne S'est jamais apperçüe dans Sa grossesse, que Sa gorge fût augmentée de Volume, pendant qu'ordinairement au 3e mois elle Se gonfle et va toujours en croissant de plus en plus; alors Ce Seroit au Lait qu'il faudroit attribuer tous les Ravages dont je viens de rendre compte

DeBaute

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

No. 8